

## SORTE: BROWN 84

### Zusammenfassung

- Rotbraune, runde Salattomate, kleine Früchte, möglicherweise leicht platzend.
- Leicht über dem Durchschnitt liegender Ertrag. Allerdings ist Einschätzung noch etwas unsicher.
- Die Sorte ist spätreif und braucht etwa 88 Tage von Pflanzung bis zu den ersten reifen Früchten.
- Sorte ist mäßig anfällig gegenüber Braunfäule.
- Eine Bewertung des Geschmacks ist noch nicht möglich.
- Nur 6 von 10 Erhalterinnen wollen die Sorte erneut anbauen.



### Allgemeines

1. Anzahl Erhalter: 21 Anzahl auswertbarer Bögen: 11
2. Orte: gut über Deutschland verteilt, relativ viele Orte in Höhenlagen

Ort	Region	Höhe m über NHN
<b>Rösrath 2018, Dach</b>	südöstlich von Köln im Rheinisch-Bergischen Kreis	90
<b>Ganzlin 2018, FL</b>	Gemeinde im Osten des Landkreises Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern	86
<b>Berlin 2019, FL</b>		30-115
<b>Hildesheim 2019, FL</b>	Niedersachsen rund 30 km südöstlich von Hannover	81
<b>Rinchnach 2021, FL</b>	Region Donau-Wald inmitten des Naturparks Bayerischer Wald	600
<b>Irmenach 2021, FL</b>	Hunsrück in Rheinland-Pfalz	445
<b>Letschin 2021, FL</b>	Brandenburg, Oderbruch	8
<b>Witzenhausen 2021, GWH</b>	Nord Hessen	147
<b>Limbach-Oberfrohna 2021, Dach</b>	Landkreis Zwickau im Südwesten von Sachsen	350
<b>Büdesheim 2021, FL + GWH</b>	Eifelkreis Bitburg-Prüm in Rheinland-Pfalz	500
<b>Nordhausen 2021, GWH</b>	Südharzrand, Thüringen	208

3. Witterung:

Durchschnittstemperatur lag während der Vegetationsperiode im Schnitt 2°C über dem Durchschnittswert. Gleichzeitig war es vor allem im Norden und Osten extrem trocken (Bautzen). 2021: Kühles und feuchtes Jahr mit spätem Vegetationsbeginn und Frösten bis in den Juni.

### Anbaumethoden

Düngung: Organische Düngung vor und zur Pflanzung an allen Standorten, sowie während der Vegetation, außer in Irmenach und Hildesheim.

Bewässerung: ja

Ausgeizen: 5 Erhalterinnen haben die Sorte eintriebzig gezogen, 6 haben 2- 3 oder mehr Triebe zugelassen.

Aktiver Pflanzenschutz: 2021 wurde in Irmenach mit Backpulverlösung gespritzt und in Nordhausen mit einem Pilzmittel.

### Merkmale

1. Frucht

Rotbraune, runde Tomate mit kleinen (<5cm) Früchten. Fruchtgewicht im Durchschnitt 44g (8 Beobachtungen- recht einheitlich von 40-52g). Die Platzfestigkeit wurde an 10 Standorten beurteilt, die Sorte war uneinheitlich und an vier Standorten eher leicht platzend.

2. Reifezeit in Tagen: 88 (12,5 Wochen), n= 9; Bereich: 77 bis 97 Tage. Sorte ist spätreif. In Ganzlin war davon abweichend die Reifezeit mit 53 Tagen sehr kurz, Ursache unklar (Fehler bei Erfassung?)

3. Ertrag nach Einschätzung: 3,1 mittel, n=11; oder, wenn die beiden wegen Braunfäule stark abweichenden, sehr niedrigen Werte nicht berücksichtigt werden: 3,6 mittel-hoch, n=9  
Bereich: 3-5. Meist werden 5-6 Früchte je Wirtel gebildet.

4. Phytophthora-Toleranz:

Die Sorte ist anfällig. Von 14 Erhalterinnen hatten 2021 4 einen kompletten Ausfall wegen Braunfäule – das ist weniger, als bei anderen Sorten. Auch bei den 7 Erhaltern, die einen Auswertebogen geschickt haben trat Braunfäule auf, aber häufig waren die Früchte nicht oder wenig befallen.

5. Geschmack: kann nicht gut beurteilt werden, da Wertungen sehr unterschiedlich ausfielen – von „missfällt mir sehr“ bis „hoch aromatisch“ war alles dabei.

Homogenität: gut, es gab einige abweichende Pflanzen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Vermischung zurückgeführt werden können.