


## SORTE: SCHWARZER MAURE

### Zusammenfassung

- Rotbraune, hochrunde Salattomate, kleine Früchte, platzfest.
- Mittlerer bis hoher Ertrag durch zahlreiche Früchte.
- Reife ist früh, zumindest an den meisten Standorten
- Sorte ist mäßig anfällig gegenüber Braunfäule.
- Der Geschmack wurde von 8 Erhalterinnen sehr positiv bewertet, würziges Aroma, kräftige Farbe.
- 8 von 10 Erhalterinnen wollen die Sorte erneut anbauen.



### Allgemeines

1. Anzahl Erhalter: 17 Anzahl auswertbarer Bögen: 10
2. Orte: gut verteilt, nur Norden fehlt

Ort	Region	Höhe m über NHN
Bautzen 2019, Dach	Ost-Sachsen	204
München 2019, GWH	Bayern	519
Freising 2019, 2021, GWH + FL in beiden Jahren	30 Kilometer nördlich von München	448
Erfurt 2019, GWH	Südrand des Thüringer Beckens	194
Bad Teinach-Zavelstein 2021, Dach	Nagold- und Enztal im Nordschwarzwald, rau und windig	580
Münster 2021, FL	Land Nordrhein-Westfalen, Münsterland	60
Beetzseeheide 2021, GWH	Landkreis Potsdam-Mittelmark in Brandenburg	37
Lorsch 2021, GWH	Oberrheinische Tiefebene westlich des Odenwalds zwischen Darmstadt im Norden und Mannheim im Süden	98
Aalter 2021, FL	Belgien, Provinz Ostflandern	10

3. Witterung:  
Durchschnittstemperatur lag während der Vegetationsperiode im Schnitt 2°C über dem Durchschnittswert. Gleichzeitig war es vor allem im Norden und Osten extrem trocken (Bautzen). 2021: Kühles und feuchtes Jahr mit spätem Vegetationsbeginn und Frösten bis in den Juni.

## Anbaumethoden

Düngung: Erfurt keine Düngung, da Boden sehr nährstoffreich. Ansonsten organische Düngung vor und zur Pflanzung an allen Standorten, sowie während der Vegetation, außer in Münster.

Bewässerung: ja

Ausgeizen: 5 Erhalterinnen haben die Sorte eintriebig gezogen, 5 haben 2- 3 oder mehr Triebe zugelassen.

Aktiver Pflanzenschutz: 2021 wurde an zwei Standorten (Aalter, Bad Teinach-Zavelstein) mit Backpulverlösung gespritzt.

## Merkmale

1. Frucht  
Rotbraune, hochrunde Tomate mit kleinen (<5cm) Früchten. Fruchtgewicht im Durchschnitt 28g (8 Beobachtungen- recht einheitlich). Die Platzfestigkeit wurde an 9 Standorten beurteilt, die Sorte war einheitlich platzfest.
2. Reifezeit in Tagen: 57 (ca. 8 Wochen), n= 7; Bereich: 55 bis 63 Tage (in Münster 45 Tage bei später Pflanzung Mitte Juni von vermutlich schon großen Pflanzen). Zwei Standorte hatten davon abweichend eine sehr lange Reifezeit von 100 und 103 Tagen: Bad Teinach in etwa 500m Höhe und Lorsch- Ursache unklar.
3. Ertrag nach Einschätzung: 3,3 mittel-hoch, n=10; Bereich: 2-4. Meist werden >7 Früchte je Wirtel gebildet.
4. Phytophthora-Toleranz:  
Die Sorte ist anfällig. Von 12 Erhalterinnen hatten 2021 4 einen kompletten Ausfall wegen Braunfäule. Bei weiteren fünf Erhaltern trat Braunfäule ebenfalls auf, aber später oder nur im Freiland. 2019 an zwei Standorten Samtfleckenkrankheit im GWH. In Erfurt Blütenendfäule bei 14% der Früchte
5. Geschmack (ohne Standort Erfurt, weil dort die Beurteilung stark von anderen Erhaltern abwich. Möglicherweise Hinweis, dass die Sorte auf Überdüngung sehr negativ reagiert.)

Beliebtheit (Skala 1-5)	9 Angaben: wenig 1x (2) bis sehr hoch (5): Ø 4,1
Süße (Skala 1-5)	7 Angaben, niedrig (2) bis hoch (4): Ø 3,0
Säure (Skala 1-5)	7 Angaben, übereinstimmend mittel (3): Ø 3,00
Stärke des Aromas (Skala 1-5)	7 Angaben, niedrig 1x (2) bis sehr hoch (5): Ø 3,71
Konsistenz	Cremig bis saftig mit fester Schale

6. Homogenität: gut